COMO SE PROTEGER?



- Não consuma bebidas de procedência duvidosa;
- Evite produtos sem rótulo, lacre ou selo fiscal;
- Desconfie de bebidas muito baratas;
- Prefira marcas conhecidas e estabelecimentos regularizados.

ONDE LIGAR EM CASO DE EMERGÊNCIA?



Centro de Informação Toxicológica 0800 722 6001

Vigilância Sanitária local

(procure o contato na prefeitura de sua cidade)

Sites oficiais e fontes governamentais:

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil)

Informações sobre bebidas adulteradas, segurança alimentar e alertas sanitários. https://www.gov.br/anvisa

Ministério da Saúde (Brasil)

Boletins de saúde pública, vigilância epidemiológica e intoxicações. https://www.gov.br/saude

Fiocruz - Fundação Oswaldo Cruz

Pesquisas sobre saúde pública, toxicologia e vigilância sanitária. https://portal.fiocruz.br

Centro de Informação Toxicológica (CIATOX HCFMUSP)

Referência em intoxicações por produtos químicos, medicamentos e substâncias tóxicas. https://saude.sp.gov.br/ses/perfil/cidadao/homepage-old2/outros-destagues/centros-de-assistencia-toxicologica

O CONSUMO DE BEBIDA CONTAMINADA COM METANOL PODE SER FATAL!



Saiba como reconhecer os sintomas e agir rapidamente







O QUE É METANOL?

O metanol é um tipo de álcool altamente tóxico, usado industrialmente como solvente ou combustível. Não é próprio para consumo humano. Quando adicionado ilegalmente a bebidas alcoólicas, pode causar intoxicação grave e até levar à morte.



COMO O METANOL VAI PARAR NA BEBIDA?

Adulteração de bebidas artesanais ou caseiras;

Produção clandestina com ingredientes de baixa qualidade;

Falta de fiscalização e controle sanitário.

SINTOMAS DE INTOXICAÇÃO POR METANOL

Podem aparecer entre **30 minutos** e **72 horas** após o consumo:

Sintomas iniciais:

- Náuseas e vômitos:
- Dor de cabeça intensa;
- Tontura e fraqueza;
- Dor abdominal.

Sintomas intermediários:

- Visão turva ou embaçada;
- Sensação de "ver tudo cinza";
- Dificuldade para respirar;
- Confusão mental.

Sintomas graves:


- Cegueira parcial ou total;
- Convulsões;
- Perda de consciência;
- Parada respiratória;
- Morte.

O QUE FAZER DIANTE DE UM CASO SUSPEITO?





2. Não espere os sintomas piorarem. Quanto mais rápido o atendimento, maiores as chances de recuperação.



 Leve a embalagem da bebida (se possível) e dados do local onde a comprou/consumiu.

Isso ajuda na identificação e investigação da contaminação.

4. Comunique as autoridades sanitárias.

Ajude a evitar novas vítimas.

