

Orienta-se com seu Farmacêutico

Dr. (a) _____

CRF-SP nº _____

Tel: _____

Este folder pode ser reproduzido, desde que citada a fonte

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CASO DE DISFAGIA E/OU USO DE SONDAS



Solicite a orientação do Farmacêutico antes de usar qualquer medicamento, mesmo os que não precisam de receita médica.



Pergunte ao Farmacêutico como conservar os medicamentos de forma correta.



Ao utilizar medicamentos, não siga recomendações de vizinhos, amigos e parentes, consulte sempre o Farmacêutico.



Quando for à farmácia, consulte o Farmacêutico. Ele deve estar sempre identificado.



Relate ao Farmacêutico o aparecimento de qualquer problema ao utilizar um medicamento.



Evite bebidas alcoólicas se estiver utilizando medicamentos.



Visite: www.crfsp.org.br



Dra. Luciana Canetto Fernandes
Presidente

Dr. Adriano Falvo
Secretário-Geral

Dra. Danyelle Cristine Marini
Vice-Presidente

**Dra. Adryella de Paula
Ferreira Luz**
Diretora-Tesoureira

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R. Capote Valente, 487 • Jd. América • 05409-001 • São Paulo • SP
Tel.: (11) 3067-1450 • atendimento@crfsp.org.br

Diretoria

Gestão 2024- 2025




CRF SP
**CONSELHO REGIONAL
DE FARMÁCIA**
DO ESTADO DE SÃO PAULO



**GRUPO TÉCNICO
DE TRABALHO DE
CUIDADO FARMACÊUTICO
À PESSOA IDOSA**

Administração de medicamentos em caso de disfagia e/ou uso de sondas

Devido a dificuldades para ingerir medicamentos (e alimentos) por via oral, alguns pacientes podem necessitar de adaptações ou uso de sondas (nasoenteral, nasogástrica ou gastrostomia, por exemplo) para a sua administração.




Você sabia que medicamentos como



Cápsulas duras ou gelatinosas



Comprimidos revestidos ou drágeas



Cápsulas de liberação prolongada

Não devem ser triturados ou partidos devido ao risco de aumento ou redução do efeito e até mesmo de obstrução de sondas ?!

Consulte sempre o farmacêutico!

Fique atento às orientações abaixo:



Sempre que possível, deve-se optar por medicamentos líquidos, como soluções orais, xaropes ou suspensões.

Converse com seu médico e o farmacêutico para avaliar as alternativas!

Informe-se quanto à necessidade de pausa na alimentação para a administração de alguns medicamentos!

São exemplos a Levotiroxina (Hipotireoidismo), Levodopa + benserazida (Parkinson), entre outros.

Nestes casos, as pausas devem ser idealmente de 30 a 60 minutos antes e após a administração (Converse com seu médico e o farmacêutico para definir a melhor estratégia!).



Lave sempre a sonda antes e após a administração de cada medicamento com 15 a 30 ml de água.

Em caso de medicamentos líquidos e com alta viscosidade, recomenda-se a diluição com 15 a 30 ml de água.

