

Orientar-se com seu Farmacêutico

Dr. (a) _____

CRF-SP nº _____







Tel: _____

FARMACÊUTICOS
CONTRA A

SÍFILIS

Este folder pode ser reproduzido, desde que citada a fonte

Faça a coisa certa

-  Solicite a orientação do Farmacêutico antes de usar qualquer medicamento, mesmo os que não precisam de receita médica.
-  Pergunte ao Farmacêutico como conservar os medicamentos de forma correta.
-  Ao utilizar medicamentos, não siga recomendações de vizinhos, amigos e parentes, consulte sempre o Farmacêutico.
-  Quando for à farmácia, consulte o Farmacêutico. Ele deve estar sempre identificado.
-  Relate ao Farmacêutico o aparecimento de qualquer problema ao utilizar um medicamento.
-  Evite bebidas alcoólicas se estiver utilizando medicamentos.



Visite: www.crfsp.org.br

Diretoria
Gestão 2024 - 2025



CRF SP
CONSELHO REGIONAL
DE FARMÁCIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO

Marcelo Polacow Bisson
Presidente

Luciana Canetto
Fernandes
Vice-Presidente

Adriano Falvo
Secretário-Geral

Danyelle Cristine Marini
Diretora-Tesoureira



CRF SP
CONSELHO REGIONAL
DE FARMÁCIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R. Capote Valente, 487 • Jd. América • 05409-001 • São Paulo • SP
Tel.: (11) 3067-1450 • atendimento@crfsp.org.br

SÍFILIS



O que é?

É uma infecção sexualmente transmissível (IST), que pode ocasionar graves danos à saúde quando não tratada.

Sífilis Adquirida

É transmitida pela relação sexual sem camisinha com uma pessoa infectada ou pelo contato com sangue contaminado.

Sinais e Sintomas

- Ferida no local de contato (por ex.: pênis, vagina, ânus, boca) que não costuma doer, arder ou coçar;
- Úlcera (cancro duro);
- Caroço na virilha;
- AManchas no corpo, especialmente nas palmas das mãos e nas plantas dos pés;
- Problemas nos ossos, no coração e neurológicos, podendo levar à morte.

Em alguns casos, não há sinais ou sintomas, apesar da doença permanecer no organismo.

Sífilis Congênita

É transmitida da mãe para a criança durante a gestação ou o parto (transmissão vertical).

Principais riscos da sífilis congênita

- Aborto;
- Cegueira;
- Surdez;
- Deficiência mental;
- Morte do recém-nascido.

Proteja o bebê!

É fundamental que as gestantes realizem o acompanhamento pré-natal e o teste para detectar a sífilis.

Quanto mais rápido for o diagnóstico e o tratamento, menores serão os riscos para a criança.

É importante tratar também as parcerias sexuais da gestante para que não haja reinfecção.



Prevenção

A principal forma de prevenir a sífilis é utilizar camisinha (feminina ou masculina) durante as relações sexuais, inclusive no período de gestação e amamentação.

A camisinha garante proteção contra a sífilis e também contra outras IST.

Diagnóstico

Os testes/exames de sífilis podem ser feitos gratuitamente nas unidades públicas de saúde.



Tratamento

O tratamento é realizado com medicamentos que necessitam de prescrição médica e podem ser adquiridos de forma gratuita nas unidades públicas de saúde.

As parcerias sexuais das pessoas infectadas também precisam ser tratadas.

Atenção!

A sífilis tem cura, mas se houver relação sexual desprotegida com uma pessoa que esteja infectada, a infecção pode ocorrer novamente.

O desaparecimento dos sinais e sintomas não significa que a doença esteja curada. É preciso fazer o tratamento correto para que a doença desapareça e se prevenir para que ela não apareça outra vez!

Farmacêutico

O farmacêutico está à sua disposição nas farmácias e unidades públicas de saúde. Procure o farmacêutico para esclarecer suas dúvidas e se orientar sobre a sífilis.

